



مقياس الرياضيات 1 (السلسلة الرابعة) الاشتقاقية

التمرين 01: عين مشتقة كل دالة مما يلي:

$$h(x) = \frac{\cos x}{x}, \quad g(x) = \frac{x^2 - 5x}{x - 3}, \quad f(x) = 5x^4 - 15x^3 + 23$$

التمرين 02: عين مشتقات الدوال الآتية:

$$1. \quad f: x \mapsto (x^3 - 5x^2 - 4)^7 \quad \text{على } \mathbb{R} \quad 2. \quad g: x \mapsto \frac{1}{(x^2 - 2x - 3)^3} \quad \text{على }]3; +\infty[.$$

$$3. \quad h: x \mapsto \sqrt{x^2 - 4} \quad \text{على }]2; +\infty[.$$

التمرين 03: عين الدالة المشتقة الأولى و الثانية للدالة في كل حالة:

$$h(x) = \ln(x^2 - x + 1), \quad g(x) = \frac{e^x}{x^2 - 3x}, \quad f(x) = (x^5 - x^3 + 4)e^x$$

التمرين 04:

ليكن a و b عددين حقيقيين. نعرف الدالة f كالاتي

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x \leq 0 \\ \frac{1}{1+x}, & x > 0 \end{cases}$$

- (1) اوجد قيمة a, b حتى تكون f مستمرة على \mathbb{R} .
- (2) اوجد قيمة a, b حتى تكون f قابلة للاشتقاق على \mathbb{R} . استنتج في هذه الحالة $f'(0)$.

التمرين 05:

ادرس قابلية اشتقاق الدالة f عند النقطة x_0 في كل حالة مما يلي :

$$(1) \quad f(x) = \sqrt{x+5} \quad ; \quad x_0 = 1$$

$$(2^*) \quad f(x) = \sqrt{3x+10} \quad ; \quad x_0 = 2$$

$$(3) \quad f(x) = \ln(1+|x|) \quad ; \quad x_0 = 0 \quad ; \quad f(x) = |x| \sin(x) \quad (*)$$

التمرين 06 (*):

اوجد مجال الاشتقاقية ثم احسب المشتقة ذات الرتبة 1 للدوال التالية :

$$f_1(x) = \frac{1}{1+x} \quad ; \quad f_2(x) = \frac{1}{1-x} \quad ; \quad f_3(x) = xe^x$$

$$f_4(x) = (x^2 + x + 1)e^{-x} \quad ; \quad f_5(x) = \frac{1}{n!} x^n (1 + x^n) \quad ; \quad f_6(x) = \ln(x)$$