LES GRANDES CRISES BIOLOGIQUES

-

Une illustration par les données
paléontologiques et géologiques

Historique de la notion de temps géologique

Définition d'une crise biologique majeure

De la difficulté de reconnaître une crise majeure

Vue générale : le «big five», les crises mineures, moteurs de l'évolution,...

La crise K/T : faits biologiques, faits géologiques et interprétations

La crise Permien/Trias : faits biologiques, géologiques et interprétations

Les 3 autres grandes crises : fin de l'Ordovicien, Dévonien supérieur et fin du Trias

Conclusion ... et vers une sixième crise ?

HISTORIQUE: le temps géologique irréversible et la construction de l'échelle stratigraphique

Buffon (1707-1788)

Histoire et théorie de la Terre

- *s'inspire des travaux de De Maillet (1656-1738)*
- introduit la notion **d'irréversibilité du temps** :
 - 1) empilement des strates livre le déroulement du temps;
 - 2) histoire de la Terre a une durée de 75.000 ans = long refroidissement (subdivisé en 7 périodes).

Brongniart (1770-1847)

- **suprématie du fossile sur la lithologie** > corrélations biostratigraphiques plutôt que lithostratigraphiques;
- introduit la notion de **corrélations à distance** (faunes semblables dans couches identiques éloignées > synchronisme).

Lyell (1797-1875)

Principles of Geology

- introduit la notion d'**actualisme** (phénomènes actuels ont opéré dans le passé).

d'Orbigny (1802-1857)

- *s'inspire des travaux de Smith (1769-1839), qui définit un système stratigraphique en 27 niveaux pour l'histoire de la Terre.*
- crée l'échelle stratigraphique, introduit les termes de terrains (= série), subdivisés en étages.
- histoire de la Terre longue > évolution «lente» des êtres vivants

INTERNATIONAL STRATIGRAPHIC CHART

International Commission on Stratigraphy

Eonothem Eon	Erathem Era	System Period	Series Epoch	Stage Age	Age Ma	GSSP	
Phanerozoic	Cenozoic	Quaternary*	Holocene		0.0118		
			Pleistocene	Upper		0.126	
				Middle		0.781	
			Pliocene	Lower		1.806	
				Gelasian		2.588	
		Piacenzian			3.600		
		Neogene	Miocene	Zanclean		5.332	
				Messinian		7.246	
				Tortonian		11.608	
				Serravallian		13.82	
	Langhian				15.97		
	Oligocene		Burdigalian		20.43		
			Aquitanian		23.03		
			Chatian		28.4 ± 0.1		
			Rupelian		33.9 ± 0.1		
			Priabonian		37.2 ± 0.1		
	Paleogene	Eocene	Bartonian		40.4 ± 0.2		
			Lutetian		48.6 ± 0.2		
			Ypresian		55.8 ± 0.2		
			Thanetian		58.7 ± 0.2		
			Selandian		61.7 ± 0.2		
		Paleocene	Danian		65.5 ± 0.3		
			Maastrichtian		70.6 ± 0.6		
			Campanian		83.5 ± 0.7		
			Santonian		85.8 ± 0.7		
			Coniacian		89.3 ± 1.0		
	Mesozoic	Cretaceous	Upper	Turonian		93.5 ± 0.8	
				Cenomanian		99.6 ± 0.9	
			Lower	Albian		112.0 ± 1.0	
				Aptian		125.0 ± 1.0	
Barremian					130.0 ± 1.5		
Carboniferous		Upper	Hauterivian		136.4 ± 2.0		
			Valanginian		140.2 ± 3.0		
		Lower	Berriasian		145.5 ± 4.0		

Eonothem Eon	Erathem Era	System Period	Series Epoch	Stage Age	Age Ma	GSSP
Phanerozoic	Mesozoic	Jurassic	Upper	Tithonian		145.5 ± 4.0
				Kimmeridgian		150.8 ± 4.0
			Middle	Oxfordian		155.7 ± 4.0
				Callovian		161.2 ± 4.0
				Bathonian		164.7 ± 4.0
		Lower	Bejocian		167.7 ± 3.5	
			Aalenian		171.6 ± 3.0	
			Toarcian		175.6 ± 2.0	
			Pliensbachian		183.0 ± 1.5	
			Sinemurian		189.6 ± 1.5	
	Triassic	Upper	Hettangian		196.5 ± 1.0	
			Rhaetian		199.6 ± 0.6	
			Norian		203.6 ± 1.5	
			Carnian		216.5 ± 2.0	
			Ladinian		228.0 ± 2.0	
		Middle	Anisian		237.0 ± 2.0	
			Artinskian		245.0 ± 1.5	
			Olenekian		249.7 ± 0.7	
			Induan		251.0 ± 0.4	
			Lower	Changhsingian		253.8 ± 0.7
	Wuchiapingian			260.4 ± 0.7		
	Capitanian			265.8 ± 0.7		
	Wordian			268.0 ± 0.7		
	Roadian			270.6 ± 0.7		
	Permian	Lopingian	Kungurian		275.6 ± 0.7	
			Artinskian		284.4 ± 0.7	
			Sakmarian		294.6 ± 0.8	
			Asselian		299.0 ± 0.8	
			Gzhelian		303.9 ± 0.9	
		Guadalupian	Kasimovian		306.5 ± 1.0	
Moscovian				311.7 ± 1.1		
Bashkirian				318.1 ± 1.3		
Serpukhovian				326.4 ± 1.6		
Visean				345.3 ± 2.1		
Paleozoic	Carboniferous	Upper	Tournaisian		359.2 ± 2.5	
		Middle				
	Lower					

Eonothem Eon	Erathem Era	System Period	Series Epoch	Stage Age	Age Ma	GSSP
Phanerozoic	Paleozoic	Devonian	Upper	Famennian		359.2 ± 2.5
				Frasnian		374.5 ± 2.6
			Middle	Givetian		385.3 ± 2.6
				Eifelian		391.8 ± 2.7
				Emsian		397.5 ± 2.7
		Lower	Pragian		407.0 ± 2.8	
			Lochkovian		411.2 ± 2.8	
			Pridoli		416.0 ± 2.8	
			Ludlow		418.7 ± 2.7	
			Ludfordian		421.3 ± 2.6	
	Silurian	Wenlock	Gorstian		422.9 ± 2.5	
			Homerian		426.2 ± 2.4	
			Sheinwoodian		428.2 ± 2.3	
			Telychian		436.0 ± 1.9	
			Aeronian		439.0 ± 1.8	
		Llandovery	Rhuddanian		443.7 ± 1.5	
			Hirnantian		445.6 ± 1.5	
			Katian		455.8 ± 1.6	
			Sandbian		460.9 ± 1.6	
			Darriwilian		468.1 ± 1.6	
	Ordovician	Upper	Stage 3		471.8 ± 1.6	
			Floian		478.6 ± 1.7	
			Tremadocian		488.3 ± 1.7	
			Stage 10		~ 492.0*	
			Stage 9		~ 496.0*	
		Lower	Paibian		501.0 ± 2.0	
			Stage 7		~ 503.0*	
			Drumian		~ 506.5*	
			Stage 5		~ 510.0*	
			Stage 4		~ 517.0*	
Cambrian	Series 3	Stage 3		~ 521.0*		
		Stage 2		~ 534.6*		
	Series 2	Stage 2		~ 534.6*		
		Stage 1		542.0 ± 1.0		

Eonothem Eon	Erathem Era	System Period	Age Ma	GSSP GSSA	
Precambrian	Proterozoic	Neo-proterozoic	Ediacaran	542	
			Cryogenian	~630	
			Tonian	850	
		Meso-proterozoic	Stenian	1000	
			Ectasian	1200	
			Calymmian	1400	
			Statherian	1600	
		Paleo-proterozoic	Orosirian	1800	
			Rhyacian	2050	
			Siderian	2300	
	Archean	Neoarchean		2500	
				2800	
		Mesoarchean		3200	
				3600	
		Boarchean			

Subdivisions of the global geologic record are formally defined by their lower boundary. Each unit of the Phanerozoic (~542 Ma to Present) and the base of Ediacaran are defined by a basal Global Standard Section and Point (GSSP), whereas Precambrian units are formally subdivided by absolute age (Global Standard Stratigraphic Age, GSSA). Details of each GSSP are posted on the ICS website (www.stratigraphy.org).

International chronostratigraphic units, rank, names and formal status are approved by the International Commission on Stratigraphy (ICS) and ratified by the International Union of Geological Sciences (IUGS).

Numerical ages of the unit boundaries in the Phanerozoic are subject to revision. Some stages within the Ordovician and Cambrian will be formally named upon international agreement on their GSSP limits. Most sub-Series boundaries (e.g., Middle and Upper Aptian) are not formally defined.

Colors are according to the Commission for the Geological Map of the World (www.cgmw.org).

The listed numerical ages are from 'A Geologic Time Scale 2004', by F.M. Gradstein, J.G. Ogg, A.G. Smith, et al. (2004; Cambridge University Press).

This chart was drafted by Gabi Ogg. Intra Cambrian unit ages with * are informal, and awaiting ratified definitions.

Copyright © 2007 International Commission on Stratigraphy

* The status of the Quaternary is not yet decided. Its base may be assigned as the base of the Gelasian and extend the base of the Pleistocene to 2.6 Ma.

DEFINITION

Crise biologique majeure (ou extinction de masse) =
disparition en masse d'espèces, dans un temps «court» et identifiable
à l'échelle globale

> 3 critères

- 1) Critère taxonomique: grand nombre espèces, genres, familles,...;
- 2) Critère temporel: «instantanéité»;
- 3) Critère paléogéographique: témoignages sur l'ensemble de la Terre.

3 types de crises

catastrophiques

par étapes

graduelles

BIG FIVE

Fin du Crétacé (-65 Ma)

Fin du Trias (-200 Ma)

Fin du Permien (-251 Ma)

Dévonien supérieur (-365 Ma)

Fin de l'Ordovicien (-443 Ma)

Vue générale

	FIN DE L'ORDOVICIEN	DEVONIEN SUPERIEUR	PERMIEN SUPERIEUR	TRIAS SUPERIEUR	LIMITE CRETACE/TERTIAIRE
Milieus et Groupes concernés	<i>Milieu récifal</i> <ul style="list-style-type: none"> • Coraux (solitaires) • Bryozoaires • Brachiopodes • Trilobites • Graptolites • Échinodermes 	<i>Milieu récifal</i> <ul style="list-style-type: none"> • Coraux tabulés • Stromatopiridés • Poissons (ostracodermes) • Trilobites • Brachiopodes • Conodontes • Tentaculites 	<i>Milieu récifal</i> <ul style="list-style-type: none"> • Trilobites • Coraux • Brachiopodes (articulés) • Gigantostrocés • Fusulines 	<i>Milieu récifal</i> <ul style="list-style-type: none"> • Ammonoïdes • Nautiloïdes • Conodontes • Poissons placodontes • Amphibiens • Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonites • Bélemnites • Rudistes • Inocérames • Dinosaures s.l. • Plancton
Pourcentages de taxons disparus	Familles: 20-26% Genres: 50-60% Espèces marines: 85%	Familles: 21-22% Genres: 47-57% Espèces marines: 70-80%	Familles: 50-57% Genres: 70-83% Espèces marines: 85-96%	Familles: 22-23% Genres: 40-53% Espèces marines: 75%	Familles: 15-16% Genres: 40-50% Espèces marines: 75%

Crises biologiques du Phanérozoïque

Pourcentage de taxons disparus

Crises intermédiaires et mineures

Cénomaniens supérieur

durée +/- 1 Ma

7% des familles

26% des genres marins

Phase 1: peuplements
benthiques: rudistes,
foraminifères, ostracodes

Phase 2: organismes
planctoniques :
phytoplancton, foraminifères

plus de 30
crises
intermédiaires
et mineures

De l'importance des crises intermédiaires

40% des disparitions sont dues aux petites crises (classe 0-5%) !

Crises = moteur de l'évolution

Exemple des ammonoïdes

Diagrams illustrating differences in types of ammonoid sutures, all based on Permian species: *A*, goniatic, *Adrianites defordi* MILLER & FURNISH, $\times 1.3$; *B*, ceratitic, *Stacheoceras toumanskyae* MILLER-F., $\times 2$; *C*, ammonitic, *Perrinites hilli* (SMITH), $\times 2.7$ (110).

AMMONOÏDÉS

Vue générale

-65 Ma

-205 Ma

-250 Ma

-365 Ma

-435 Ma

Crétacé - Tertiaire: dinosaures (excep. Oiseaux), ammonites, bélemnites, rudistes, foraminifères planctoniques,...

Fin Trias: Orthoceras et Cératites

Fin Permien: Graptolithes, trilobites, tétracoralliaires, tabulés, Goniatites, Fusulines,...

Dévonien sup. (Frasnien-Famennien): tentaculites

Fin Ordovicien: Graptolites, trilobites, céphalopodes, brachiopodes et échinodermes fixés

CRISE de la LIMITE CRETACE-TERTIAIRE

Erathem/ Ere	Système/ Période	Etage	Age	Incertitude
Cénozoïque	Paléogène	Danien	65,5	+/- 0,3
Mésozoïque	Crétacé	Maestrichien		

Era	Period	Epoch	Age (Ma)	
CENOZOIC	Quaternary	Holocene	0.0118	
		Pleistocene	U/L	0.126
			Middle	0.781
			L/E	1.806
	Neogene	Pliocene	5.33 ± 0.05	
		Miocene	22.9 ± 0.1	
	Paleogene	Oligocene		33.9 ± 0.1
				54.8 ± 0.5
		Eocene		65.0 ± 0.05
				99.0 ± 1.0
Cretaceous	Upper/Late	144.8 ± 3.7		
	Lower/Early	156.6 ± 2.7		
MESOZOIC	Jurassic	Upper/Late	178.0 ± 1.5	
		Middle	200 ± 1.0	
	Triassic	Upper/Late	231 ± 5	
		Middle	244 ± 1	
Paleozoic	Permian	Lower/Early	253 ± 2	
		Upper/Late	258 ± 5	
	Carboniferous	Middle	229 ± 5	
		Lower/Early	300 ± 3	
PALEOZOIC	Pennsylvanian	Upper/Late	306.5 ± 1.0	
		Middle	311.7 ± 1.1	
		Lower/Early	318.0 ± 1.3	
	Mississippian	Upper/Late	326.4 ± 1.6	
		Middle	345.3 ± 2.1	
	Devonian	Lower/Early	360 ± 2	
		Upper/Late	383 ± 4	
	Silurian	Middle	394 ± 2	
		Lower/Early	418 ± 2	
	Ordovician	Upper/Late	424 ± 1	
Middle		443 ± 4		
Lower/Early		460.9 ± 1.6		
Cambrian	Middle	471.8 ± 1.6		
	Lower/Early	489 ± 1		
PRECAMBRIAN	Proterozoic	Upper/Late	499 ± 5	
		Middle	509 ± 1	
		Lower/Early	544 ± 1	
	Archean	Neoproterozoic	1,000 ± 50	
		Mesoproterozoic	1,600	
		Paleoproterozoic	2,500	
Archean	Neoarchean	2,800		
	Mesoarchean	3,200		
	Paleoarchean	3,600		
	Eoarchean	3,800

Observation à l'échelle mondiale

Location map of the most complete K-T boundary sections used in this study. Stippled pattern marks submerged shallow continental shelf areas. Note that dots mark localities, many of which represent between 4 and 10 sections (e.g., Spain, Texas, Mexico, Negev). DSDP is Deep Sea Drilling Project, ODP is Ocean Drilling Program.

Observation en milieu marin

Depositional depths of K-T boundary sections span from shallow continental shelf (middle neritic) to the upwelling area of the shelf-slope break and to the deep open ocean. Note that deep-sea sections contain very condensed sedimentation across the K-T transition due to reduced sedimentation, dissolution, and sometimes erosion. ODP is Ocean Drilling Program, DSDP is Deep Sea Drilling Program.

Faits biologiques en milieu marin

	LIMITE CRETACE/ TERTIAIRE
Groupes concernés	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonites • Bélemnites • Rudistes • Inocérames • Dinosaurés s.l. • Plancton
Pourcentages de taxons disparus	Familles: 15-16% Genres: 40-50% Espèces marines: 75%

FIGURE 4

La crise paléontologique à la limite K/T. A : remplacement des Nannofossiles calcaires dans le forage DSDP 384 Atlantique N-W B : décroissance de la diversité générique (d'après Russell, 1979).

Haptophytes

(Ex. Coccolithophoridés)

Flagellés unicellulaires photosynthétiques:

- à exosquelettes composés de pièces calcaires dures, appelées Coccolithes
- forme le nanoplancton marin

Coccolithes dissociées après la mort de l'individu > formation de la Craie

Craie des falaises du Boulonnais

Foraminifères planctoniques

- Unicellulaires
- Taille millimétrique
- Test trochospiralé
- 1 ouverture simple

Globigérines

Globotruncana

Brachiopodes

Cyclothyris

Pygope

Les espèces de brachiopodes au passage Crétacé-Tertiaire de Nye Klov (Danemark). Chaque trait vertical représente l'extension stratigraphique d'une espèce. D'après les données modifiées de Surlyk F.

Rudistes

Hippurites

Radiolites

Rudistes

Coupes longitudinale (à gauche) et transversale (à droite) d'une coquille de rudiste de la famille des Hippuritidae. La couche calcitique de la coquille est en jaune, les couches aragonitiques en rose. La masse viscérale était enfermée dans une cavité (en bleu). Le rudiste, fixé par l'apex, croissait verticalement. Les couches en ménisques (dénommées tabulae) jalonnent les différentes étapes de la croissance (d'après R. Cestari et D. Sartorio, modifié).

Belemnites

Ammonites

Baculites

Nostoceras

Nipponites

Extinction des ammonites : déclin continu sur une longue période

3 genres d'ammonites

50 genres d'ammonites

100 genres d'ammonites

baisse de la diversité

3

5

13

Coupe de Bidart (France)

+
baisse du taux d'évolution
(Landman, 1996)

Ammonites : crise de la diversité liée aux variations du niveau marin

régressions > crises

transgressions > radiations

Phylloceras et Lytoceras, derniers survivants

Faits biologiques en milieu continental

Vertébrés

Pourcentage d'espèces survivantes parmi les principaux groupes de vertébrés répertoriés au passage Crétacé-Tertiaire dans le Montana. Les estimations portent sur 107 espèces recensées dont 19 espèces de dinosaures. D'après les données modifiées d' Archibald J. D. in Macleod et Keller (1996).

Faits biologiques en milieu continental

Reptiles

Edmontosaurus

Allosaurus

Ptérodactylus

Ichthyosaurus

Faits biologiques en milieu continental

Reptiles

Familles de crocodiles
Extinction = 37%

Familles de cheloniens
Extinction = 26%

Familles de lézards, serpents, ...
Extinction = 6%

Renouvellement des familles

Faits biologiques en milieu continental

Vertébrés

Groupe	Familles présentes	Familles éteintes	Taux d'extinction
Chondrichthyens (Requins & Raies)	44	8	18
Poissons osseux	50	6	12
Amphibiens	11	0	0
Chéloniens (Tortues)	15	4	27
Lacertiliens (Lézards et Serpents)	16	1	6
Crocodiliens	14	5	36
Ptérosauriens (« reptiles volants »)	2	2	100
Plésiosauriens (« reptiles marins »)	3	3	100
Dinosauriens sauf Oiseaux	21	21	100
Oiseaux	12	9	75
Mammifères	22	5	23
Groupes « primitifs »	11	1	9
Marsupiaux	4	3	75
Placentaires	7	1	14
Total des Vertébrés	210	64	30
Poissons	94	14	15
Tétrapodes	116	50	43
Amniotes	105	50	48

Faits biologiques en milieu continental

Essor des mammifères

GISEMENTS	EUROPE	ASIE	AMÉRIQUE DU NORD	AMÉRIQUE DU SUD	AFRIQUE	MADA-GASCAR	INDE	ANTARCTIQUE ET AUSTRALIE
ESPECES								
PALÉOCÈNE	5	125	>100	20	1	0	0	0
MAASTRICHTIEN-CAMPANIEN	6	>8	>40	6	0	1	1	0
SANTONIEN-CÉNOMANIEN	0	>8	>6	0	0	0	0	0

5. NOMBRES de gisements et d'espèces mammifères connus au passage Crétacé-Tertiaire.

Faits géologiques: transgression - régression marines

évolution des surfaces continentales
(en millions de m²)

Changement paléogéographique de l'Amérique du Nord entre la transgression maximale du Crétacé supérieur (A) et la régression maximale vers le limite Crétacé-Tertiaire (B). Les flèches indiquent le passage des organismes terrestres entre l'Asie et l'Amérique du Nord. D'après les données modifiées de J. D. Archibald *in* MacLeod et Keller (1996). Avec l'aimable permission de W. W. Norton & Company.

Faits géologiques : régression marine

transgression crétacée

- Forte augmentation de la surface des plateaux continentaux
- Moins de compétition
- Augmentation de la biodiversité

régression fini-crétacée

- Forte diminution de la surface des plateaux continentaux: **29 millions de km² découverts**
- Crise de la biosphère

Faits géologiques: le stratotype de la coupe d'El Kef (Tunisie)

Stratotype = coupe étalon de servant de référence pour la définition et la reconnaissance d'une unité (chrono-)stratigraphique et de ses limites.

Chute du % de CaCO_3 et apparition d'une sédimentation argileuse

> baisse de la température de l'eau et diminution de la photosynthèse (crise de la chaîne alimentaire)

Chute du $\delta^{13}\text{C}$

> diminution de la photosynthèse

Horizon riche en spinelles nickélifères (cristaux formés lorsque les météorites rentrent dans l'atmosphère)

Pic d'Iridium

(travaux d'Alvarez et fils, années 1980)

Volcanisme intense des trapps du Deccan

INTENSITE: épaisseur moyenne de 2400 m, surface comparable à celle de la France !

AU MOMENT DE LA CRISE: l'âge radiométrique des laves = âge de la limite C-T.

« **INSTANTANE** »: paléomagnétisme montre que l'ensemble du plateau basaltique s'est édifié pendant l'inversion 29R, ce qui donne une durée très «courte» de 600 000 ans

2400m

Proposition de scénario

- 1) Baisse du taux d'expansion océanique > baisse du niveau eustatique global > régression marine > forte crise des organismes des milieux récifaux
- 2) Mise en place de points chauds et production de grandes éruptions volcaniques > poussières volcaniques dans la haute atmosphère > réduction de la luminosité > pluies acides et production de SO_2 par les volcans > refroidissement du climat > affection de toute la biosphère
- 3) Impact d'une météorite à -65 Ma (? Chicxulub, Yucatan, Mexique)

Le cratère de Chicxulub

Figure 2. Situation géographique du cratère de Chicxulub.

Le cratère de Chicxulub

Cratère invisible en surface
mais visible par gravimétrie !

Présence d'un cratère d'impact

Figure 11. Cartoon summary cross section of the Chicxulub impact based on the new seismic reflection data. The four major ringed zones of deformation are indicated: I, the peak ring; II, the outer margin of collapsed terrace blocks; III, the restored crater rim area; and IV, the thrust faults and shears of the ring fracture. Other labels on the cross section indicate the fate of rock originally in the position indicated [from Melosh, 1989]. An oblique impact is indicated by the large arrowhead; the resulting thrusting, collapse along normal faults, terrace formation and flow within the lower crust is therefore drawn as asymmetrical. The N-S designation is arbitrary.

Gravimétrie: méthode géophysique qui étudie les variations du champ de pesanteur et donc de densité des roches

Proposition de scénario

Impact > 3 effets :

1. **Choc thermique** au moment de l'impact > réchauffement brutal de l'air et de l'eau et grands incendies *Durée quelques heures à quelques jours*

2. **Refroidissement à court terme** : rejet d'une grande quantité de poussières et d'acide sulfurique dans l'atmosphère qui arrêtent les rayons du soleil > photosynthèse stoppée et chaînes alimentaires rompues en milieu marin et continental + baisse de la T d'une dizaine de degrés *Durée plusieurs mois ou années*
 - 3.1. **Pluies acides**: acide sulfurique tombe > acidification des océans > élimination du plancton et suppression de la production de CaCO_3
 - 3.2. **Réchauffement à long terme**: CO_2 libéré par l'impact s'est accru (plus de fixation par organismes et moins de forêts) > alliance avec la vapeur d'eau et des oxydes nitriques > effet de serre > hausse de la T de l'air d'une dizaine de degrés *pendant plusieurs années à dizaines de milliers d'années*

Synthèse des événements

Accumulation de plusieurs causes néfastes à la biosphère, donnant le caractère de l'extinction en masse de la limite Cr/T. Schéma théorique destiné à conceptualiser le phénomène. En pointillés : courbe résultante de l'extinction en masse majeure.

CRISE de la FIN du PERMIEN

Erathem/ Ere	Système/ Période	Etage	Age	Incertitude
Mésozoïque	Trias	Induan	251	+/- 0,4
Paléozoïque	Permien	Changhsingien

Impact sur la biodiversité

Era	Period	Epoch	Age (Ma)	
CENOZOIC	Quaternary	Holocene	0.0118	
		Pleistocene	U/L	0.126
			Middle	0.781
			L/E	1.806
	Tertiary	Neogene	Pliocene	5.33 ± 0.05
			Miocene	22.9 ± 0.1
	Paleogene	Oligocene		33.9 ± 0.1
				54.8 ± 0.5
		Paleocene		65.0 ± 0.05
				99.0 ± 1.0
MESOZOIC	Cretaceous	Upper/Late	144.8 ± 3.7	
		Lower/Early	156.6 ± 2.7	
	Jurassic	Middle	178.0 ± 1.5	
		Lower/Early	200 ± 1.0	
	Triassic	Upper/Late	231 ± 5	
		Middle	244 ± 1	
		Lower/Early	253 ± 2	
		Upper/Late	258 ± 5	
	Permian	Lower/Early	229 ± 5	
		Upper/Late	300 ± 3	
PALEOZOIC	Carboniferous	Upper/Late	306.5 ± 1.0	
		Middle	311.7 ± 1.1	
		Lower/Early	318.0 ± 1.3	
	Mississippian	Upper/Late	326.4 ± 1.6	
		Middle	343.3 ± 2.1	
	Devonian	Lower/Early	360 ± 2	
		Upper/Late	383 ± 4	
	Silurian	Middle	394 ± 2	
		Lower/Early	418 ± 2	
	Ordovician	Upper/Late	424 ± 1	
Lower/Early		443 ± 4		
Cambrian	Upper/Late	460.9 ± 1.6		
	Middle	471.8 ± 1.6		
PRECAMBRIAN	Proterozoic	Upper/Late	489 ± 1	
		Middle	499 ± 5	
		Lower/Early	509 ± 1	
	Archean	Neoproterozoic	544 ± 1	
		Mesoproterozoic	1,000 ± 50	
		Paleoproterozoic	1,600	
		Neoarchean	2,500	
		Mesoarchean	2,800	
		Paleoarchean	3,200	
		Eoarchean	3,600	

Ammonoïdes

Trilobites

Coraux

TOUJOURS PLUS HAUT

En se posant sur le fond, la larve de corail se métamorphose. Elle devient polype, avec un gros estomac surmonté de tentacules. Les cellules-maçons de sa paroi externe absorbent alors les carbonates et le calcium de l'eau de mer pour en faire du ciment. Elles édifient un plancher,

puis un mur d'enceinte circulaire et des séries d'arcs-boutants. La construction se poursuivant en hauteur, le polype trop étiré est obligé de quitter sa loge d'origine pour monter d'un étage.

Coraux tétracoralliaires

Zaphrentis

Calceola

Coraux tabulés

Halysites

Favosites

Brachiopodes

Productus

Répartition stratigraphique des ordres de brachiopodes illustrés par un genre. Extrait de Clarkson E. N. K. (1986).

Spirifer

Rhynchonella

Terebratula

Brachiopodes

Brachiopodes paléozoïques et Bivalves méso- et cénozoïques

Echinodermes

Libres
(Echinoïde)

Hemicidaris

Fixés
(Blastoïde, Crinoïde)

Encrinurus

Archaeocidaris

Pentremites

Echinodermes: Oursins

Oursins réguliers
(à symétrie axiale)

Echinodermes: Oursins irréguliers

Faits biologiques en milieu continental

Flore

L'événement fongique (E. F.) de la limite Permien-Trias. Tendances schématiques inspirées de données palynologiques quantitatives d' Eshet *et al.* (1995).

Acritarches

Kystes d'algues unicellulaires du phytoplancton, de 5 à 50 microns

↕ < 50.000 ans

Vertébrés

70 à 77% des familles

Groupes concernés : amphibiens et reptiles Thérapsides (reptiles mammaliens)

FIGURE 34 : Diversité des familles de Tétrapodes continentaux. I = Amphibiens primitifs, Anapsides et Reptiles à tendances mammaliennes. II = Premiers diapsides, Dinosauriens et Ptérosaures. III = Amphibiens modernes, lézards, serpents, tortues, crocodiles, oiseaux et mammifères. 1 à 5 : crises biologiques apparentes. Extrait de M. J. Benton in Larwood G. P. (1988).

Cynognathus

Bauria

Insectes:

pic de diversité au Permien supérieur puis chute de 63% au Trias inférieur

FIGURE 130 : Diversité familiale des insectes au cours du phanérozoïque. Extrait de Jarzembowski E. A. & Ross A. in Hart M. B. (1996). Avec l'aimable autorisation de la Geological Society Publishing House.

Faits géologiques

Formation de la Pangée

+

Variations de l'orbite terrestre

Fait 1: continentalisation du climat global et diminution des milieux côtiers à forte biomasse

Surface actuelle des bassins évaporitiques et des bassins houillers en fonction des périodes de dépôts. D'après Moraw J. R., Schander E. & Walliser O. H. in Walliser O. H. (1996).

Fig.2 Un climat très rude

APPLIQUÉS aux conditions régnant lors de la crise, les modèles couplés océan-atmosphère indiquent qu'il pleuvait très peu (en jaune) sur le mégacontinent, la Pangée. Il y faisait aussi très chaud en moyenne sous les tropiques (36 °C, en fuchsia) et frais sur l'Antarctique (jusqu'à -4 °C, en mauve). Côté océan, la température de surface était également très élevée à l'équateur (32 °C, en rose), où les pluies se concentraient (en bleu). Les courants marins étaient rapides à l'équateur (en bleu), mais seulement jusqu'à une profondeur d'environ 2 000 mètres. Presque partout ailleurs, les eaux stagnaient (en jaune et beige).

Fait 2: régression marine

Conséquences: Continentalisation et aridité du climat

Remarque: les cycles transgression-régression sont liés aux super-cycles tectoniques « regroupements en Pangée - dispersion des continents »

Émersion de sédiments très riches en matière organique > augmentation du taux de CO_2 dans l'atmosphère > empoisonnement des individus

Modèle de Berner proposant une estimation moyenne générale de la teneur atmosphérique en CO_2 au cours du Phanérozoïque. Sur l'axe des ordonnées, l'unité représente la valeur du taux actuel du CO_2 (= 0,03%).

LE POURCENTAGE D'OXYGÈNE DANS L'ATMOSPHÈRE (en vert) a chuté fortement à la fin du Permien. En même temps, la teneur en dioxyde de carbone (en gris) a été multipliée par six en quelques millions d'années.

Réduction des surfaces épicontinentales > chute de la productivité biologique et du $\delta^{13}C$; disparition de niches écologiques favorables à la vie

Epicontinental: zone marine en bordure d'un continent, au-dessus du plateau continental

Fait 3: baisse de la salinité des eaux

Fermeture de bassins épicontinentaux > accumulation de dépôts salins sur les continents > moins de sel dissous dans les océans > baisse de la salinité

baisse entre 5 et 10% > disparition des organismes sténohalins: échinodermes, céphalopodes, coraux.

Sténohalin: qui présente une tolérance faible aux variations de salinité

Fait 4: éruptions géantes

épanchements volcaniques des trapps de Sibérie :

- épaisseur > 3000m
- volume > 2.500.000 km³
- durée +/- 1 Ma en 11 phases éruptives

- > rejet de SO₂ > pluies acides
- > poussières > obscurcissement

- > rejet de CO₂ > effet de serre

Localisation supposée des trapps de Sibérie

Fait 5: dégagement de méthane

Effet de serre dû aux éruptions volcaniques

- > réchauffement climatique
- > dégel de glaces d'eau, présentes à 1000m sous le plancher océanique, renfermant des hydrates de méthane
- > augmentation de l'effet de serre
- > nouvelle hausse des T (+10 C) > nouvelle fonte des hydrates > nouvelle hausse T > ...

Fait 6: montée eustatique au Trias (+ 200-210m)

Montée d'eaux mal oxygénées

> anoxie des eaux de surface

> conditions défavorables à la vie marine

Synthèse des événements

Trias inférieur:

Transgression d'eaux mal oxygénées > conditions défavorables à la vie

Limite Permien-Trias:

Volcanisme > effet de serre, dégagement de méthane et pluies acides

Permien supérieur:

Régression, réchauffement climatique, aridité, baisse de la salinité

> conditions défavorables à la vie

Stratotype de la limite Permien-Trias: coupe D de Meishan (Sud de la Chine)

conodonte

	Hindeodus parvus Zone
Hindeodus typicalis fauna	Hindeodus typicalis - Clarkina
Clarkina meishanensis fauna	meishanensis Zone

Yin et al. (2001)

Géoparc

Stratotype = coupe étalon de servant de référence pour la définition et la reconnaissance d'une unité (chrono-)stratigraphique et de ses limites.

Un impact météorique, autre coupable ?

Indice 1 : ? fullerènes

Indice 2 : cratère d'impact de 480 km de D

Gravimétrie: méthode géophysique qui étudie les variations du champ de pesanteur et donc de densité des roches

Impact météorique, oui ou non ?

OUI pour

Becker (Science 2004) : Le lieu, la taille et l'âge du cratère de Bedout peuvent expliquer les enregistrements de débris d'impact, dans les sédiments de la limite Permien-Trias, découvertes dans le monde entier.

NON pour

Wignall (Science 2004) : nous concluons que, soit l'impact ne s'est pas produit pendant l'intervalle Permien terminal - Trias basal (et il n'y a donc aucun rapport avec l'extinction de masse Permien-Trias), soit ce n'est pas un cratère d'impact mais plutôt une structure volcanique.

Renne (Science 2004) : par conséquent, le témoignage d'une structure d'impact de Bedout, d'âge limite Permien-Trias, doit être considéré avec la plus grande précaution.

Témoignages d'un magmatisme

Témoignages d'un magmatisme

Figure 1 Distribution mondiale des Grandes Provinces Magmatiques mises en place depuis 275 ma. D'après Bryan et Ernst (2008).

Fig 2. Theoretical thermal profile in Panzhihua-like contact aureole. The maximum distances in the aureole where the metamorphic reactions happen are plotted with bars in which the black fraction represents the amount of gas formed.

Dégagement de SO₂ et CO₂

Rôle des roche sédimentaires

Fig 1. Volume of erupted basalt from Courtillot and Renne (2003) vs Percentage of generic extinctions (from Rhodes and Muller 2005) for major LIPs.

Figure 24 Conséquences sur l'environnement de l'émission de grands volumes de gaz lors de la mise en place de grands volumes de magma dans des sédiments. Les principaux gaz d'origine magmatique impliqués sont SO/SO_2 , Cl_2 et CO/CO_2 . Le métamorphisme de contact de roches sédimentaires peut considérablement amplifier chacune de ces émissions.

AUTRES CRISES

FIN du TRIAS (-200 Ma) →

FIN du DEVONIEN (-365 Ma) →

FIN de l'ORDOVICIEN (-443 Ma) →

Era	Period	Epoch	Age (Ma)	
CENOZOIC	Quaternary	Holocene	0.0118	
		Pleistocene	U/L	0.126
			Middle	0.781
			L/E	1.806
	Tertiary	Neogene	Pliocene	5.33 ± 0.05
			Miocene	22.9 ± 0.1
		Paleogene	Oligocene	33.9 ± 0.1
			Eocene	54.8 ± 0.5
			Paleocene	65.0 ± 0.05
	MESOZOIC	Cretaceous	Upper/Late	99.0 ± 1.0
Lower/Early			144.8 ± 3.7	
Jurassic		Upper/Late	156.6 ± 2.7	
		Middle	178.0 ± 1.5	
		Lower/Early	200 ± 1.0	
Triassic		Upper/Late	231 ± 5	
		Middle	244 ± 1	
		Lower/Early	253 ± 2	
Permian		Upper/Late	258 ± 5	
		Middle	229 ± 5	
	Lower/Early	300 ± 3		
	Carboniferous	Upper/Late	306.5 ± 1.0	
		Middle	311.7 ± 1.1	
Lower/Early		318.0 ± 1.3		
Mississippian	Upper/Late	326.4 ± 1.6		
	Middle	345.3 ± 2.1		
	Lower/Early	360 ± 2		
PALEOZOIC	Devonian	Upper/Late	383 ± 4	
		Middle	394 ± 2	
	Lower/Early	418 ± 2		
		Silurian	Upper/Late	424 ± 1
Lower/Early	443 ± 4			
Ordovician	Upper/Late	460.9 ± 1.6		
	Middle	471.8 ± 1.6		
	Lower/Early	489 ± 1		
Cambrian	Upper/Late	499 ± 5		
	Middle	509 ± 1		
	Lower/Early	544 ± 1		
PRECAMBRIAN	Proterozoic	Neoproterozoic	1,000 ± 50	
		Mesoproterozoic	1,600	
		Paleoproterozoic	2,500	
	Archean	Neoaarchean	2,800	
		Mesoaarchean	3,200	
		Paleoaarchean	3,600	
		Eoaarchean	not defined	

Synthèse des faits

	FIN DE L'ORDOVICIEN	DEVONIEN SUPERIEUR	TRIAS SUPERIEUR
Causes majeures avancées	<ul style="list-style-type: none"> • Glaciation > refroidissement et régression (1) • Dérive continentale • Transgression et anoxie (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Réchauffement • Transgression et dysoxie (1) • Météorites • Refroidissement et régression (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Météorite • Volcanisme • Réchauffement • Régression (1) • Transgression (2)
Milieus et Groupes concernés	<p><i>Milieu récifal tropical</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Coraux solitaires • Bryozoaires • Brachiopodes • Graptolites • Échinodermes • Trilobites 	<p><i>Milieu récifal tropical</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Coraux coloniaux • Stromatopiridés • Brachiopodes • Ostracodes • Trilobites • Poissons agnathes 	<p><i>Milieu récifal tropical</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ammonoïdes • Nautiloïdes • Conodontes • Poissons placodontes • Amphibiens • Reptiles marins
Pourcentages de taxons disparus	<p>Familles: 20-26%</p> <p>Genres: 50-60%</p> <p>Espèces marines: 85%</p>	<p>Familles: 21-22%</p> <p>Genres: 47-57%</p> <p>Espèces marines: 70-80%</p>	<p>Familles: 22-23%</p> <p>Genres: 40-53%</p> <p>Espèces marines: 75%</p>

immenses plateaux continentaux et grandes mers épicontinentales qui abritent 90% des espèces marines

CRISE de la FIN de l'ORDOVICIEN (-443 Ma)

Critère temporel: durée de 1 à 2 Ma
2 phases: «événement pacificus» de la limite Raxtheyen-Hirnantien et intra-Hirnantien

Faits biologiques

Crise aigue chez les trilobites (38 > 14 familles), les coraux (75% genres), graptolites, conodontes,...

Caractères:

- Groupes atteints représentant du benthos (trilobites, brachiopodes,...) et pelagos (graptolites, nautiloïdes,...)
- Tous les phyla, classes et ordres subsistent mais faible diversité
- Colonisation des milieux profonds par groupes préadaptés

Crise Hirnantienne

Hirnantia

Causes possibles

1a) Changement climatique rapide à l'Ordovicien supérieur
> glaciation à très forte extension géographique
> régression (100m)

1b) Dérive continentale

> modification de la courantomologie et refroidissement des eaux peu profondes

2) Déglaciation > transgression à l'Ordovicien terminal avec anoxie

? Hypothèse d'un impact météorique très hypothétique

CRISE de la FIN du DEVONIEN (-365 Ma)

Critère temporel: durée de 10 Ma

Faits biologiques

Benthos du milieu récifal benthique, qui disparaît totalement au passage Frasnien-Famennien:

- crise aigue chez les coraux (80% genres), stromatopores (50%), brachiopodes (86%), ostracodes benthiques (80% espèces), foraminifères benthiques (70%),...

Pelagos:

- disparition des tentaculites
- crise forte chez les ammonoïdes, conodontes,...
- relais fauniques chez les acritarches, algues vertes,...

Vertébrés:

Sortie des eaux

Amphibiens primitifs

Hypothèse paléogéographique: développement de régions humides (lagunes, deltas, lacs,...) favorable à la colonisation des berges

Sarcoptérygiens

Causes possibles

- 1) Réchauffement au Givétien
- 2) Transgression maximale et dysoxie (baisse de l'oxygène dissout) au Frasnien supérieur
- 3) Série de «petits» impacts météoritiques
- 4) Refroidissement rapide au Famennien basal et forte régression

CRISE de la FIN du TRIAS (-200 Ma)

Critère temporel: durée de 17 Ma

Faits biologiques

Dans les mers:

- disparition du milieu récifal
- disparition des conodontes
- crise aigue chez les céphalopodes, bivalves, reptiles marins (placodontes et nothosaures),...

Sur les continents:

- turn-over
- apparition des premiers **dinosaures**
- crise chez les **amphibiens**

STRATIGR.		CONSTRUCTEURS	
Jurassique inférieur	Toarcien	Calcaires	Bivalves
	Pliensbachien		
	Sinemurien		
	Hettangien		
Trias supérieur	Rhétien	Eponges siliceuses	Coraux
	Norien		
	Carnien

Coraux

Era	Period	Epoch	Age (Ma)		
CENOZOIC	Quaternary	Holocene	0.0118		
		Pleistocene	U/L	0.125	
			Middle	1.781	
	Tertiary	Neogene	Pliocene	5.33 ± 0.05	
			Miocene	22.9 ± 0.1	
		Paleogene	Oligocene	33.9 ± 0.1	
			Eocene	54.8 ± 0.5	
			Paleocene	65.0 ± 0.05	
			Cretaceous	Upper/Late	99.0 ± 1.0
				Lower/Early	144.8 ± 3.7
Jurassic	Upper/Late	156.6 ± 2.7			
	Middle	178.0 ± 1.5			
	Lower/Early	200 ± 1.0			
Triassic	Upper/Late	231 ± 5			
	Middle	244 ± 1			
MEZOZOIC	Permian	Lower/Early	253 ± 2		
		Upper/Late	258 ± 5		
		Middle	229 ± 5		
	Carboniferous	Upper/Late	306.5 ± 1.0		
		Middle	311.7 ± 1.1		
	Mississippian	Lower/Early	318.0 ± 1.3		
		Upper/Late	326.4 ± 1.6		
		Middle	345.3 ± 2.1		
	Devonian	Lower/Early	368 ± 2		
		Upper/Late	383 ± 4		
Silurian	Lower/Early	394 ± 2			
	Upper/Late	418 ± 2			
Ordovician	Lower/Early	424 ± 1			
	Upper/Late	441 ± 4			
	Middle	460.1 ± 1.8			
Cambrian	Lower/Early	471.8 ± 1.6			
	Upper/Late	489 ± 1			
PRECAMBRIAN	Proterozoic	Upper/Late	499 ± 5		
		Middle	509 ± 1		
		Lower/Early	544 ± 1		
	Archean	Neoproterozoic	1,000 ± 50		
		Mesoproterozoic	1,600		
		Paleoproterozoic	2,500		
		Neoarchean	2,800		
		Mesoarchean	3,200		
		Paleoarchean	3,600		
		Eoarchean	4,600		

Hexacoralliaires

Tabulés

Tetracoralliaires

CONCLUSIONS

Les crises biologiques sont dues à:

- des modifications dans la dynamique terrestre
- des événements extraterrestres

Ces événements terrestre ou extraterrestres conduisent à:

- du volcanisme
- des régressions et transgressions
- des changements climatiques
- des variations de la salinité
- des anoxies et dysoxies
- des impacts de météorites

La conjonction et la succession «rapide» de ces phénomènes géologiques conduisent aux grandes crises biologiques

Les grandes crises biologiques sont un facteur majeur de l'évolution (disparitions - apparitions) de la vie sur la Terre

Et l'action de l'Homme ? Une sixième crise ?

Vertébrés disparus

Oiseaux	Toutes espèces confondues	258
Mammifères	Marsupiaux	11
	Insectivores	12
	Chiroptères	7
	Primates	3
	Lagomorphes	1
	Rongeurs	30
	Carnivores	25
	Pinnipèdes	2
	Proboscidiens	2
	Siréniens	1
	Périssodactyles	6
	Artiodactyles	6
	TOTAL	106

Amphibiens	Anoures	1
	Discoglossidés	1
	TOTAL	2
Poissons	Catostomatidés	4
	Coregonidés	2
	Crottidés	1
	Cyprinidés	6
	Cyprinodontidés	6
	Protoctidés	1
	TOTAL	20
Reptiles	Tortues	12
	Crocodiles	2
	Lézards	12
	Serpents	8
	TOTAL	34

Une sixième crise !

Les causes :

- Destruction des habitats directe (déforestation,) ou indirecte (changement climatique , pollutions) > 30.000 espèces / an !!!
- Invasions par des espèces allogènes
- Elimination par la pêche

La grande « nouveauté » : pour la première fois, la crise est due à l'action d'une espèce, NOUS, et non à des phénomènes physiques !!!