

المصفوفة الأولى: $\mathbf{A}$
 هي مصفوفة $n \times n$ حيث n عدد المتغيرات
 (المعلمات) $(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$
 المعطاة (المعروفة) (known values)
 هي: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$

$$u_1 = \begin{pmatrix} -0.70 \\ -0.15 \\ 1.0 \end{pmatrix} \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0.05 \\ -0.98 \\ 0.17 \end{pmatrix} \quad u_3 = \begin{pmatrix} -0.71 \\ 0.08 \\ 0.70 \end{pmatrix}$$

المصفوفة الثانية: $\mathbf{B}$
 هي مصفوفة $n \times n$ حيث n عدد المتغيرات
 المعطاة (المعروفة) (known values)

	comp1	comp2	comp3
ind1	1.48	-1.92	-0.08
ind2	0.02	0.44	1.38
ind3	-0.04	-0.85	0.02
⋮	⋮	⋮	⋮
ind10	-0.14	0.73	-0.56

المصفوفة

1 - مصفوفة المتغيرات المعطاة (المعروفة)

2 - مصفوفة المتغيرات المعطاة (المعروفة)

