

الآليات الطاقوية

Les filières énergétiques

المبادئ و الآليات الطاقوية في النشاط البدني و الرياضي

ترتفع الاحتياجات الميتابوليزمية في العضلة كلما أرتفع المجهود العضلي و هذا المصدر الطاقوي خاضع لتكيفات عضلية دورية قلبية و تنفسية و عصبية، فالجهاز العصبي يسير هذا النظام، حيث يرسل إشارات كهربائية من خلال الألياف الحركية مما يؤدي إلى طرح الأستيل كولين المخزن في الألياف العصبية في مناطق الترابط العصبي العضلي و هذا ما يسمح لبدأ نظام خلوي مستقل للعضلة يعطي طاقة للتقلص العضلي و هذه الطاقة منبعها النظام الصادر من:

مخزون عضوي يستعمل مباشرة مع وجود الأوكسجين أو في انعدامه

من الاحتراق البطيء للغلو سيدات، ليبيدات و البروتيدات المخزونة في العضلة أو المتحركة في الدم.

نظام لا هوائي دون حمض اللبن.

نظام لا هوائي حمضي.

نظام هوائي

كما توجد 03 أنظمة رئيسية
ATP تعتبر كمنبع طاقي لل:
الضروري للتقلص العضلي:

1- الآلية الطاقوية اللاهوائية:

أوضح (Jousselin, 1990) عند عملية التقلص العضلي العنيف و السريع، يعتبر مخزون الأوكسجين و سرعة التكون غير كافيين لذا يجب على الليف العضلي أن يجد مصادر اخرى للتموين بـ (ATP) بسرعة و بكمية كبيرة و للعضلة منبعين لسد النقص في النظام اللاهوائي"

المنبع الثاني: من خلال الغليكوجين أو الميكانيزم اللاهوائي مع تكون حمض اللبن.
الآلية الطاقوية اللاهوائية اللابنية (النظام الفوسفاتي):

المنبع الأول: من خلال الكرياتين فوسفات الذي يسمح بتركيب (ATP) في غياب الأوكسجين (O_2) و يسمى الميكانيزم اللاهوائي دون حمض اللبن.

1-1 الآلية الطاقوية اللاهوائية اللاابنية :

و هي مجموع التفاعلات التي تضمن إنتاج طاقة (ATP) في غياب الأكسجين (لاهوائي) و بدون إنتاج نهائي لحمض اللبن، حيث تتدخل هذه الشعبة في بداية التمرين باستخدام الكميات القليلة المتواجدة في العضلة أو عن طريق الفوسفوكرياتين الذي ينتج طاقة بسرعة و هذا في وجود أنزيم الفوسفوكرياتين كيناز (CPK) عبر التفاعل التالي




كما أن إنتاج الطاقة (ATP) يمكن أن ينجز عن طريق تمييع جريئتين من ADP مع تشكيل جزيئة AMP في و جد أنزيم الميوكيناز (MK).




يتواجد مخزون ATP في الخلية العضلية حيث تتراوح نسبته إلى 6 ملي مول/كغ أما مخزون الفوسفو كرياتين يتراوح من 20-30 ملي مول/كغ من وزن العضلة


A- la configuration structurale d'une molécule d'ATP fait apparaitre des liaisons phosphate riches en énergie



B- lorsque le troisième groupement phosphate de la molécule d'ATP est hydrolysé sous l'action de l'ATP ase , l'énergie est libérée



Reconstitution de l'ATP à partir de l'énergie stockée dans PCr



كما يندرج ضمن هذا النظام قسمين و هما

السعة اللاهوائية اللابينية : و هي كمية الطاقة الكلية لنشاط ممدد نوعا من حيث المدة، يعطي طاقة تسمى القدرة الطاقوية لهذا النظام، تعطى بالمجال الزمني التالي:
10ثا-20ثا حيث يتم استهلاك (ATP) و الكرياتين فوسفات (CP)

القدرة القصوى اللاهوائية اللابينية:
و هي بداية الطاقة الآلية، كمية العمل المرتبط بوحدة زمنية. أو الكمية القصوى للطاقة و التي ترتفع أثناء التمرين المرافق للوحدة الزمنية التي تتراوح من 0-10 ثا،

2-1 الآلية الطاقوية اللاهوائية للبنية (نظام الجلوكزة):

يعتبر هذا النظام عبارة عن سلسلة من التفاعلات التي تسمح بإنتاج طاقة (ATP)، عن طريق هدم الجلوكوز، و بدون استخدام الأوكسجين مع إنتاج نهائي لحمض اللبن. كما أن عملية هدم الجلوكوز أو الجليكوجين:



و نعرف كل من القدرة و السعة في هذا النظام بـ:


القدرة القصوى اللاهوائية اللبنية:


و هي كمية الطاقة المنتجة خلال 30-40 ثانية الأولى من التمرين . تقيم تحت شكل ميكانيكي خلال تمرين ذا شدة قصوى في مدة 30 ثانية و ممكن أن تقاس خلال 15 - 20 ثانية ومن بين العوامل المحددة لهذا النظام نجد مدى اندفاع عملية الغليكوليز اللاهوائي و مدى نشاط أنزيم (PFK) و عدد و حجم الألياف ذات النوع II و كذا النشاط الحركي.

السعة اللاهوائية اللبنية

و هي الكمية القصوى للطاقة المنتجة من خلال الجلوكزة اللاهوائية، وهي تأثر خاصة على الألياف العضلية ذات النوع IIa ، IIb أثناء التدريب لمدة 30ثا إلى غاية 1,5 د، تتأثر خاصة بهبوط مستوى الـ: PH، و بذلك فدرجة الحمضية تختلف من تمرين لآخر حسب مدة و شدة المجهود البدني المبذول حيث يصل تركيز حمض اللبن في الدم إلى 20ملي.مول/ل.

Schéma général de la transformation du glucose (molécule à 6 carbone) et du glycogène (chaîne de molécules de glucose) , en acide pyruvique (molécule à 3 carbones). Ce processus dit anaérobie , comporte une dizaine d'étape





2- الآلية الطاقوية الهوائية

و هي عبارة عن مجموعة التفاعلات التي تنتج طاقة (ATP) و ذلك بتدخل الأوكسجين، السكريات، الدهون، وثنائيا البروتينات، و في حضور الأوكسجين تدخل الكمية الكبيرة من حمض البيروفيك الناتجة من تحلل الغلوكوز في تفاعل مع كونزيم A من أجل إعطاء الأستيل كونزيم A، لتتم مراحل التفاعل بالأكسدة في الميتوكوندري أثناء حلقة كربس مصاحبا ذلك تحرير غاز الكربون و ديدروجان، المسئول عن نقل (FAD-NAD) في السلسلة التنفسية) :

و بالنسبة للنظام الهوائي نعرف كل من القدرة و السعة الهوائية كالتالي

القدرة القصوى الهوائية:

هي البداية القصوى لأكسجين و الحجم الأقصى لأكسجين الموجود على المستوى الرئوي و المنقول في الجهاز الدوري التنفسي من طرف هيموغلوبين الدم و الفسفرة التأكسدية في الميتوكوندري تحت تأثير التمرين البدني، و خلال و حدة زمنية


السعة القصوى الهوائية:

هي الكمية القصوى للطاقة الممكنة من خلال أكسدة المركبات الطاقوية، فالمدادومة القصوى الهوائية تقاس بمدة الجهد البدني المطبق بعد حصول التعب في مستوى معين من الحجم الأقصى للأكسجين المستهلك أو السرعة القصوى الهوائية، تمثل المدادومة القصوى الهوائية بكمية العمل المنجز أو المسافة المقطوعة أثناء الجري

A. L'ATP comme source directe d'énergie

Energie chimique


Réserve :
env. 5 μmol
par g de muscle




B. Régénération de l'ATP

1 Décomposition de la créatine phosphate

Réserve :
env. 25 $\mu\text{mol/g}$
de muscle



2 Glycolyse anaérobie



3 Oxydation du glucose

